


イオウカンフルローションを使用されている方へ

# イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p><b>1</b> 開封後は冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p><b>2</b> 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p><b>4</b> 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p><b>3</b> <b>朝</b> 透明のうわずみを使います。</p> 	<p><b>晩</b> よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p><b>5</b> 患部にやさしく塗布してください。(眼又は眼の周囲には使用しないこと)</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>


丸石製薬株式会社

201508  
202410 TP

イオウカンフルローションを使用されている方へ

# イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p><b>1</b> 開封後は冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p><b>2</b> 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p><b>4</b> 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p><b>3</b> <b>朝</b> 透明のうわずみを使います。</p> 	<p><b>晩</b> よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p><b>5</b> 患部にやさしく塗布してください。(眼又は眼の周囲には使用しないこと)</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>


丸石製薬株式会社

201508  
202410 TP

イオウカンフルローションを使用されている方へ

# イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p><b>1</b> 開封後は冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p><b>2</b> 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p><b>4</b> 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p><b>3</b> <b>朝</b> 透明のうわずみを使います。</p> 	<p><b>晩</b> よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p><b>5</b> 患部にやさしく塗布してください。(眼又は眼の周囲には使用しないこと)</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>

丸石製薬株式会社

201508  
202410 TP

イオウカンフルローションを使用されている方へ

# イオウカンフルローションの使い方

1日2回患部に塗布します。朝はうわずみ、晩はよくまぜてご使用ください。

<p><b>1</b> 開封後は冷蔵庫に入れて保管してください。</p>  <p>色や匂いなどが変わった液は使用しないでください。</p>	<p><b>2</b> 洗顔後、手をきれいに洗います。</p>  <p>スキンケアは、症状に応じ医師の指示に従ってください。</p>	<p><b>4</b> 滅菌ガーゼやきれいな手に液を取ります。</p>  <p>容器の口は手や滅菌ガーゼに触れないように清潔に扱ってください。一度出した液は容器に戻さないでください。</p>
<p><b>3</b> <b>朝</b> 透明のうわずみを使います。</p> 	<p><b>晩</b> よく振って、まぜてから使います。</p> 	<p><b>5</b> 患部にやさしく塗布してください。(眼又は眼の周囲には使用しないこと)</p>  <p>刺激など異常があらわれた場合は使用を中止し、医師、薬剤師にご相談ください。</p>

丸石製薬株式会社

201508  
202410 TP