トアラセット®配合錠「マルイシ」を服用される患者さんへ

このお薬は、中枢神経系に作用し、鎮痛効果を発揮します。

トラマドール塩酸塩と**アセトアミノフェン**の2つの有効成分が配合されています。これらの成分を含む他のお薬（市販の総合感冒薬や解熱鎮痛薬にも含むものがあります）と一緒に服用しないでください。**他に総合感冒薬や解熱鎮痛薬を使用している場合は医師または薬剤師にお伝えください。**

服用にあたっての注意点

- 医師の指示通りに服用してください。

  ・慢性疼痛　　：　通常 1回1錠　1日4回

  ・抜歯後の疼痛：　通常 1回2錠

- 1回2錠、1日8錠を超えて服用しないでください。
- 服用間隔は4時間以上空けてください。
- 誤って多く飲んでしまった場合、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 飲酒は避けてください。

  （アルコールによって副作用が出やすくなります。）

- 自己判断で増量・減量・中止をしないでください。

裏面もお読みください➡

注意すべき主な副作用

このお薬は、以下の副作用があらわれることがあります。

悪心（吐き気）嘔吐（おうと）

お薬の飲み始めや量を増やした時にあらわれやすく、1~2週間でなくなることが多いです。対策として吐き気を抑える薬が処方されることがあります。

便秘

対策として便秘薬が処方されることがあります。

眠気

お薬の飲み始めや量を増やした時にあらわれやすく、3~5日でなくなることが多いです。服用中は高いところでの作業、自動車の運転などの危険を伴う機械の操作はしないでください。

他にも気になることがありましたら、医師または薬剤師にご相談ください。

保管について

- 誤って飲んでしまわないよう、乳幼児・子どもの手の届かないところに保管してください。
- 薬が残った場合は、保管せず廃棄してください。
- 他の人には絶対に渡さないでください。

詳細はPMDA（医薬品医療機器総合機構 ）のホームページに掲載されている「患者向け医薬品ガイド」を参照ください。

丸石製薬株式会社

2019年7月作成